診療科	対象疾患	レジメン名称
	髄注	MTX+Ara-C+DEX
		MIT+Ara-C(MA)療法(地固め療法)
		DNR+Ara-C(DA)療法(地固め療法)
		ACR+Ara-C(AA)療法(地固め療法)
		Ara-C+VP-16+VCR+VDS(A triple V)療法(地固め療法)
	急性骨髄性白血病	CAG療法(サルベージ療法)
		Ara-C少量療法  DND LAra Onthe Arg (京知道 1 集社)
		DNR+Ara-C高齢者用(寛解導入療法) ベネクレクスタ+アザシチジン
		ベネクレクスタードリンテンク ベネクレクスター低用量シタラビン
		JALSG ALLー97 60歳以上 day1~day28
	急性リンパ性白血病	JALSG Ph+ ALL208IMA 60~64歳(寛解導入療法)
		アドセトノス (150mg以下)
	ホジキンリンパ腫	A(アドセトリス)+AVD療法
		キイトルーダ(ペムプロリズマブ)【3週間間隔】
ĺ		CHOP療法(標準)
		R-CHOP療法
		リツキシマブ(1週間コース)
		リツキシマブ(維持療法)
		B-R療法(ベンダムスチン+リツキシマブ)(初回投与)
		B-R療法(ベンダムスチン+リツキシマブ)(2回目以降)
		GDP療法
	非ホジキンリンパ腫	カブサブイハ * + CHOP (導入療法: 1コ-ス目)
		カゲイハ + OHOP (導入療法: 2~6¬-ス目)
		ガザイバ+ベンダムスチン(導入療法:1コース目)
		カ・サバー (*ング ムペノン(等八派公・1 コ ハロ) カ・サ・イハ・十へ、ンタ・ムスチン(導入療法:2~6コース目)
		リツキシマブ・ナレブラミト・療法(1コース目)
		ポライビー+BR療法(1コース目)
内科		ポライビー+BR療法(2~6コース目)
		ポライビー+R-CHP療法(1~6コース目)
		VAD療法
		ベルケイド皮下投与(3週間コース)
	多発性骨髄腫	DLd療法(2コース目)
		DLd療法(3~6コース目)
		DLd療法(7コース目以降)
		DBd療法(ベルケイド皮下注)(9コース目以降)
		DMPB療法(ベルケイド皮下注)(1コース目:day1·8は全量1000mL)
		DMPB療法(ヘブルケイ)で下注)(2~9コース目)
		DMPB療法(ベルケイド皮下注)(10コース目以降)
		サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン(1コース目)
		サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン(2コース目以降)
		DMPB療法(ダラキューロ)(1コース目)
		DMPB療法(ダラキューロ)(2~9コース目)
1		DMPB療法(ダラキューロ)(10コース目以降)
1		Kd療法(70mg/㎡週1回投与)(1コース目)
		DLd療法(ダラキュ-ロ)(3~6コース目)
1		DLd療法(ダラキュ-ロ)(7コ―ス目以降)
1		saKd療法(2¬-ス目以降)
	骨髄異型性症候群	アザシチジン点滴静注(1週間コース)
		DCyBorD療法(1~2コース目)
	全身性ALアミロイドーシス	DCyBorD療法(3~6コース目)
	· 	DCyBorD療法(7コース目以降)
	原発不明癌	PTX+CBDCA
	原先个明恕	オプジーボ(ニボルマブ)(240mg/body)【2週間間隔】
	ヴェゲナ肉芽腫症	リツキサン療法
	顕微鏡的多発血管炎	11.1
	肝細胞癌	血管造影検査(EPI+MMC:改定版)
		サイラムザ(ラムシルマブ)
消化器内科		テセントリク+アバスチン
		イミフィンジ+イジュド(初回1回のみ)【体重30kg超】
		イミフィンジ単独【体重30kg超】
外科	胃癌	CPT-11+CDDP
		TS-1+ドセタキセル(DTX)
		アブラキサン(3週毎)(180mg/㎡レジメン、初回推奨用量)
		1907/19-1 土 ナナ 井口プラエンハ
		SOX(TS-1+オキサリプラチン) サイラムザ+パクリタキセル(PTX)併用療法

診療科	対象疾患	レジメン名称
10 75 AT	<u> </u>	S-1+CDDP+トラスツズマブ(初回投与)
	胃癌	S-1+CDDP+トラスツズマブ(2回目以降)
		weeklyアブラキサン+サイラムザ
		オプジーボ(ニボルマブ)(240mg/body)【2週間間隔】
		TS-1+CDDP(大量:60mg/㎡)【改定版】
		mF0LF0X6(1ンフューサー・ポンプ)
		オプジーボ(ニボルマブ)(480mg/body)【4週間間隔】
		オプジーボ+SOX
		オプジーボ+XELOX(CapeOX)
		オプジーボ+mFOLFOX6(インフューザーポンプ)
		FOLFOX4(末梢静脈用)
		アバスチン(Bmab)+FOLFOX4(末梢静脈用)
		mFOLFOX6(インフューサー・ポンプ)
		FOLFIRI(インフューサ゛ーポンプ)
		アバスチン+mFOLFOX6(インフューサ゛ーポンプ)
		アバスチン+FOLFIRI(インフューサ゛ーポンプ)
		アービタックス+CPT-11(毎週投与)(2コース目以降)
		XELOX
		XELOX+アバスチン(Bmab)
		$^{\text{LEO}}$ $^{\text{H}}$ $^{\text{LEO}}$ $^{\text{LEO}}$ $^{\text{H}}$ $^{\text{LEO}}$ $^{\text{LEOO}}$ $^{L$
		へ <sup>*</sup> クティヒ <sup>*</sup> ックス (Pmab)+FOLFIRI(インフューサ <sup>*</sup> ーホ <sup>*</sup> ンプ <sup>*</sup> )
		へ、クティヒ、ックス(Pmab)単独
		アービタックス(Cmab)+FOLFIRI(アービタックス単独日レシ・メン)
		ア-ビタックス(Cmab)+FOLFIRI(併用日レジメン)
	大腸癌	SOX(TS-1+オキサリプラチン)
		SOX+アバスチン
		ベクティビックス(Pmab)+FOLFOX(末梢静脈用)
		ゼローダーアバスチン(Bmab)
		IRIS+アバスチン(Bmab)
		サイラムザ+FOLFIRI(インフューサ゛ーポンプ)
		サイラムザ+FOLFIRI(末梢静脈用)
		ロンサーフ+アバスチン
		S-1+アバスチン(Bmab)
外科		ザルトラップ+FOLFIRI(インフューサ゛ーポンプ)
		アービタックス+CPT-11(毎週投与)(1コース目)
		ビラフトビ+メクトビ+アービタックス(初回投与)
		ビラフトビ+メクトビ+アービタックス(2回目以降)
		XELIRI(ゼローダ + イリノテカン)
		XELIRI+アバスチン
	食道癌	bDCF(DTX+CDDP+5FU)(進行・再発JCOG1314レジメン)(アプレピタント内服レジメン)
		DCF(DTX+CDDP+5FU)(術前JCOG1109:アプレピタント内服レジメン)
		オプジーボ(ニボルマブ)(240mg/body)【2週間間隔】
		weeklyパクリタキセル(PTX)
		DCF(DTX+CDDP+5FU)(術前)(アロカリス注併用レジメン)
	乳癌	weeklyパクリタキセル(PTX)
		トラスツズマブ(初回投与:8mg/kg、3週毎)
		トラスツズマブ(2回目以降:6mg/kg、3週毎)
		ドセタキセル(DTX) 3週毎(75mg/m²)
		EC(90)(アプレピタント内服レジメン)
		パクリタキセル(PTX)+ゼローダ
		TC(DTX+CPA)
		ハラヴェン(エリブリン)
		アバスチン(Bmab)+パクリタキセル(PTX)
		パージェタ+トラスツズマブ+DTX(初回投与)
		パージェタ+トラスツズマブ+DTX(2回目以降)
		パージェタ+トラスツズマブ(7コース目以降、DTXを抜く場合)
		カドサイラ(手術不能又は再発乳癌)
		パージェタ+トラスツズマブ【術前・術後療法】(初回投与)
		ハーシェタートラスツス、マフ、【術前・術後療法】(2回目以降)
		Dose-dense パクリタキセル(PTX)
		カドサイラ(術後補助療法:14回まで)
		weekly トラスツズマブ(初回投与:4mg/kg)
		weekly トラスツズマブ(初回技与・411g/kg) weekly トラスツズマブ(2回目以降:2mg/kg)
		EC(90)(アロカリス併用レジメン)
		Dose-dense EC(アロカリス併用レジメン)
		エンハーツ

-A.d= 13.	业务产电	1 × 1× 17 Th
診療科	対象疾患	レジメン名称
	可诗	フェスゴN【術前・術後療法】(初回投与)
		フェスゴMA【術前・術後療法】(2回目以降)
	乳癌	フェスゴN+DTX【転移・再発】(初回投与)
		フェスゴMA+DTX【転移・再発】(2回目以降)
<u> </u>		フェスゴMA+DTX【転移・再発】(7回目以降、DTXを抜く場合)
		ゲムシタビン(GEM)
		CBDCA+PTX
		ナベルビン(VNR)
		カルセド(アムルビシン)
		ドセタキセル(DTX)
		ペメトレキセド(PEM)
		アバスチン+ナベルビン
		CBDCA+TS-1
		CBDCA+ペメトレキセド
	非小細胞肺癌	アバスチン+CBDCA+ペメトレキセド
		アバスチン(維持療法)
		CBDCA+アブラキサン(nab-PTX)
		キイトルーダ(ペムプロリズマブ)【3週間間隔】
		テセントリク(アテソ・リス・マフ・)
		キイトルーダ+アブラキサン(nab-PTX)+CBDCA
外科		キイトルーダ+ペメトレキセド+CBDCA(1~4コース)
7117		キイトルーダ+ペメトレキセド+CBDCA(5コース目以降:CBDCA投与なし)
		サイラムザードセタキセル(DTX)
		オプジーボ+ヤーボイ+PTX+CBDCA
		オプジーボ+ヤーボイ併用療法
		テセントリク+アブラキサン(nab-PTX)+CBDCA
		ゲムシタビン(GEM)
		GEM+TS-1
	膵癌	FOLFIRINOX
		アブラキサン+ゲムシタビン(GEM)
		オニバイド+5FU+LV(インフュ・サ・・ポンプ)
	小細胞肺癌	CBDCA+VP-16
		CDDP+CPT-11
		テセントリク+CBDCA+VP-16(導入療法)
		テセントリク+CBDCA+VP-16(維持療法)
		カルセド(アムルビシン)
	胆道癌	GEM
		GEM+S-1
		GEM+CDDP+S-1(GCS療法)
		GEM+CDDP(GC療法)【改定版】
		イミフィンジ+GC(GEM+CDDP)【体重30kg超】
		イミフィンジ単独(イミフィンジ・+GC療法後)【体重30kg超】
	膀胱癌	ピノルビン膀胱内注入(1~8回目)
		ピノルビン膀胱内注入(9~15回目)
		イムノブラダー膀胱内注入
		低用量CDDP+フルツロン
	尿路上皮癌	CBDCA+GEM
		GEM+CDDP
		キイトルーダ(ペムブロリズマブ)【3週間間隔】
泌尿器科		バベンチオ
ווי און זינע טגיי		パドセブ
		ト、セタキセル(タキソテールDTX)+プレト、ニソ・ロン
	前立腺癌	ジェブタナープレドニゾロン(投与量25mg以上)
		ニュヘックオ+DTX+PSL+ADT[mHSPC]
-	腎細胞癌	オプジーボ(ニボルマブ)(240mg/body)【2週間間隔】
		キイトルーダーインライタ【キイトルーダ・3週間間隔投与】
		バベンチオーインライタ
		TC(PTX+CBDCA) 3週毎
	卵巣癌	DC(DTX+CBDCA) 3週毎 DC(DTX+CBDCA) 3週毎
ᅔᄰᆝᆈ		GEM じささま(th 与 B O O m g も 法)
産婦人科		ドキシル(投与量90mg未満)
		TC+Bev(PTX+CBDCA+Bmab)
-	フウルド	TC+Bev(維持療法:アバスチン単独)
i l	子宮体癌	DC(DTX+CBDCA)